

Ihre Patientin/Ihr Patient hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus und appliziert

## Lantus®, Levemir®, Abasaglar® oder Toujeo®

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

### 2 Tage vor der Untersuchung:

normale Applikation. Bei Hypoglykämie-Neigung oder sehr scharfer Einstellung (HbA1c < 6.5 %);  $\frac{2}{3}$  der gewohnten Insulindosis

### 1 Tag vor der Untersuchung:

- Basis-Insulin am Abend: die Hälfte der gewohnten Dosis und Kontrolle des Blutzuckers vor dem Zubettgehen (< 6 mmol/l: Zwischen-Mahlzeit und nachmessen)
- Basis-Insulin am Morgen:  $\frac{2}{3}$  der gewohnten Dosis und Kontrolle des Blutzuckers im Tagesprofil

### Am Untersuchungstag:

- Basis-Insulin am Abend: abends wieder die gewohnte Dosis, vorausgesetzt, dass die Patienten normal essen können und die Blutzuckerwerte vor dem Abendessen über 6 mmol/l liegen
- Basis-Insulin am Morgen: die Hälfte der gewohnten Dosis NACH der Endoskopie, vor dem Essen. Blutzucker-Tagesprofil

Wir möchten Sie bitten, das Vorgehen mit dem Patienten zu besprechen.

Wir danken für die Zusammenarbeit und stehen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.